Death Rates for Certain Diseases in New Jersey
By Color
1921-1930

	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921
ALL CAUSES—										
Total	1073.4	1160.4	1155.8	1107.5	1207.2	1162.0	1152.2	1199.8	1197.6	1154.4
White	1040.4	1125.2	1118.7	1070.5	1169.7	1124.4	1119.7	1172.3	1173.8	1128.8
Colored	1659.8	1808.4	1855.3	1824.8	1953.9	1933.1	1839.8	1805.1	1741.8	1763.6
TUBERCULOSIS—(All Forms)										
Total	67.9	71.6	72.0	73.6	83.0	79.6	83.6	87.7	93.4	92.6
White	57.1	62.0	64.3	65.1	74.7	70.3	76.6	81.3	87.0	84.4
Colored	261.7	248.9	217.0	237.8	248.7	270.9	231.8	229.8	236.8	286.9
PNEUMONIA—(All Forms)										
Total	77.5	102.3	103.5	84.8	121.4	103.7	101.4	114.9	115.8	96.8
White	70.9	93.8	95.8	77.7	111.3	96.2	94.5	107.6	111.3	92.7
Colored	195.3	258.2	248.7	218.5	322.5	279.3	247.5	275.0	219.1	195.6
DISEASES OF THE HEART—										
Total	245.6	252.3	242.0	224.0	231.8	217.0	201.7	204.3	187.9	159.7
White	243.9	250.3	238.5	220.9	230.3	214.5	199.3	202.4	185.2	157.4
Colored	275.7	288.5	306.9	284.9	260.6	268.8	251.3	246.5	249.5	213.7
CANCER—										
Total	108.8	107.6	104.9	103.1	102.6	101.6	96.8	91.4	86.6	92.3
White	106.9	108.9	106.3	104.6	104.0	102.6	98.0	92.4	90.1	93.2
Colored	67.3	83.0	78.1	73.9	74.8	85.4	70.8	70.4	77.1	71.0
HOMICIDE—										
Total	5.5	4.5	4.5	4.3	4.5	5.1	4.9	5.2	4.7	5.1
White	4.1	3.3	3.4	2.8	3.2	4.3	3.9	4.3	3.9	4.7
Colored	30.8	26.4	24.5	32.7	30.4	20.8	24.4	25.2	21.2	15.9

Source: U. S. Bureau of the Census, Division of Vital Statistics, 1921-1930. Adapted.